

리포디톡주

전문의약품

LIPODETOX Injection **LV**

(티옥트산)

분류번호 : 399

■ 성분 · 함량 :

1mL 중
 티옥트산(KP) 5.0mg
 첨가제 : 탄산수소나트륨, 우레아, 염산, 주사용수

■ 성 상 : 갈색 앰플에 든 미황색의 등명한 주사액

■ 효능 · 효과

티옥트산의 수요가 증대되는 경우의 보급(격심한 육체노동시),
 Leigh증후군 (아급성괴사성뇌척수염), 중독성(스트렙토마이신,
 가나마이신에 의한) 및 소음성(직업성)의 내이성 난청

1개월 정도의 투여로도 효과가 나타나지 않을 경우에는 지속적으로 사용하지
 않는다.

■ 용법 · 용량

티옥트산으로서 통상 성인 1일 1회 10~25mg을 정맥내 주사한다.
 단, 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

■ 사용상의 주의사항

1. 경고

앰플주사제는 용기절단시 유리파편이 혼입되어, 부작용을 초래할 수 있으므로
 사용시 유리파편 혼입이 최소화될 수 있도록 신중하게 절단사용하되,
 특히 어린이, 노약자 사용시에는 각별히 주의할 것.

2. 이상반응

이 약은 사용성적조사 등 이상반응 발현빈도에 대한 명확한 조사가 실시된 바
 없다.

- 1) 소화기 : 식욕부진, 오심, 설사
- 2) 기타 : 발진, 두통, 어지러움, 심계항진

3. 고령자에 대한 투여

일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 있으므로, 감량하는 등 주의한다.

4. 적용상의 주의

이 약을 정맥내 주사시 주사속도는 가능한 천천히 주사한다.

■ 저장방법 : 차광밀봉용기, 실온(1~30℃)보관

■ 사용기간 : 제조일로부터 24개월

■ 포장단위 : 5mL X 10Amps.

※ 약은 어린이의 손에 닿지 않도록 보관해야 합니다.

※ 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다.

만약 구입 시 유효기한 또는 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된
 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국, 병원, 도매상을 통하여 교환하여 드립니다.
 기타 자세한 문의사항은 라이트팜텍으로 문의하여 주시기 바랍니다.
 (전화 : 02-801-8570)

※ 자세한 품목허가 또는 신고사항은 온라인의약도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을
 통하여 확인하시기 바랍니다.

작성년월일 : 2017.03.14

LPI-H02

[제조사]

아주약품(주)

경기도 평택시 신원로 12번길 23
 www.ajupharm.co.kr

[제조의뢰자]

셀트리온제약
CELLTRION

충청북도 진천군 이월면 반지길 47-17
 www.celltrionph.com

[판매자]

Bio Frontier
쥬라이트팜텍

서울특별시 구로구 디지털로3길 41 81호
 www.lilepharm.com