

전문약품  
분류번호:122

골격근이완제  
**세페리손정**  
(에페리손염산염)

**Ceperisone** Tab.  
(Eperisone HCl)

**【원료약품 및 분량】** 1정 중

- 유효성분 : 에페리손염산염(KP) ..... 50.0mg
- 동물유래성분 : 유당수화물(소, 우유)
- 기타 첨가제 : 경질무수규산, 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 오파드라이흰색(OY-C-7000A), 저치환도히드록시프로필셀룰로오스, 포비돈(K-30)

**【성 상】** 흰색의 원형 필름코팅정

**【효능·효과】**

- 근골격계 질환에 수반하는 동통성 근육연축 : 경견완중후군, 견관절주위염, 요통
- 신경계 질환에 의한 경직성 마비 : 뇌혈관장애, 경직성 척수마비, 경부척추증, 수술후 후유증(뇌·척수종양 포함), 외상후유증(척수손상, 두부외상), 근위축성 측색경화증, 뇌성마비, 척수소뇌변성증, 척수혈관장애, 아급성 척수시신경병변, 기타의 뇌척수질환

**【용법·용량】**

성 인 : 에페리손염산염으로서 1회 50mg 1일 3회 식후에 경구투여합니다. 연령, 증상에 따라 적절히 증감합니다.

**【사용상의 주의사항】**

- 다음 환자에는 투여하지 말아 주십시오.
  - 이 약에 과민증 환자
  - 중증의 근무력증 환자
  - 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactose deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 됩니다.
- 다음 환자에는 신중히 투여하여 주십시오.
  - 악물과민증의 병력이 있는 환자
  - 간장애 환자(간기능을 악화시킬 수 있습니다.)
- 부작용
  - 속 : 드물게 속을 일으킬 수 있으므로 관찰을 충분히 하여 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 합니다.
  - 간장 : 드물게 ALT, AST, ALP의 상승 등이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하여 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 합니다.
  - 신장 : 드물게 단백뇨, BUN의 상승 등이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하여 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 합니다.

- 4) 혈액 : 드물게 빈혈 등이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하여 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 합니다.
- 5) 과민증 : 때때로 발진, 드물게 가려움 등이 나타날 수 있습니다.
- 6) 정신신경계 : 때때로 불면, 졸음, 두통, 사지마비, 드물게 몸의 굳어짐, 사지떨림 등이 나타날 수 있습니다.
- 7) 소화기계 : 때때로 구역, 구토, 식욕부진, 위부불쾌감, 구갈, 변비, 설사, 복통, 드물게 복부팽만감, 구내염 등이 나타날 수 있습니다.
- 8) 비뇨기계 : 드물게 요폐, 요실금, 잔뇨감이 나타날 수 있습니다.
- 9) 전신증상 : 때때로 무력감, 비틀거림, 전신권태감, 드물게 어지러움, 근긴장저하 등이 나타날 수 있습니다.
- 10) 기타 : 때로 안면홍조, 드물게 발한, 부종이 나타날 수 있습니다.

**4. 일반적 주의**

- 1) 이 약 투여중에 무력감, 비틀거림, 졸음 등이 나타날 수 있으므로, 이러한 경우에는 감람 또는 투여를 중지합니다.
- 2) 졸음, 주의력·집중력·반사운동능력 등의 저하가 나타날 수 있으므로 이 약을 투여중인 환자는 자동차운전 등 위험을 수반하는 기계조작을 하지 않도록 주의합니다.

**5. 상호작용**

이 약의 유사약품인 톨페리손염산염과 메토카르바몰을 병용시 시조절장애가 나타났다는 보고가 있습니다.

**6. 임부 및 수유부에 대한 투여**

- 1) 임신중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유의성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여합니다.
- 2) 수유부에는 투여를 피하는 것이 바람직하나 부득이하게 투여할 경우에는 수유를 중단합니다.

**7. 소아에 대한 투여**

소아에 대한 안전성이 확립되어 있지 않습니다(사용경험이 적습니다).

**8. 고령자에 대한 투여**

일반적으로 고령자에서는 생리기능이 저하되어 있으므로 감람하는 등 주의합니다.

**【저장방법】** 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

**【사용기간】** 제조일로부터 24개월

**【포장단위】** 30정, 500정

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약, 구입 시 사용기한 또는 유효기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오염, 손상된 제품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다. (소비자상담실 : 080-850-3611(~2) 수신자부담)  
 ※ 이 제품 설명서 작성일자 (하단에 표시) 이후 변경된 내용은 홈페이지 (www.celltrionph.com), 온라인의약품도서관 (http://drug.mids.go.kr) 또는 문의전화(02-2216-3611(내선:3))에서 확인 하실 수 있습니다.  
 ※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.  
 ※ 유효기한 또는 사용기한이 지난 의약품을 사용하지 않도록 하십시오.

작성일자 T-2017.09.28  
관리번호 CST-M1-03

제조의뢰자 :



제조사 :

